


Efficacité et tolérance du traitement néoadjuvant avec talimogene laherparepvec dans le carcinome basocellulaire cutané



C. BÉJAR

Service de Dermatologie
Hôpital Avicenne AP-HP, BOBIGNY



RÉSUMÉ : L'essai de phase II NeoBCC a évalué l'efficacité et la tolérance du traitement néoadjuvant avec talimogene laherparepvec (T-VEC) chez des patients atteints d'un carcinome basocellulaire cutané (CBC) difficilement opérable.

T-VEC, un virus oncolytique, offre une alternative prometteuse en ciblant spécifiquement les cellules tumorales et en activant une réponse immunitaire locale. Cette étude a recruté 18 patients qui ont reçu six injections intratumorales de T-VEC sur 13 semaines. À la fin du traitement, 50 % des patients ont pu être opérés sans reconstruction complexe, avec un taux de réponse globale de 55,6 % et un profil de sécurité favorable, avec des effets indésirables principalement locaux et de faible grade. Bien que les résultats soient encourageants, des études de plus grande envergure sont nécessaires pour confirmer son efficacité.

POINTS FORTS

- Le carcinome basocellulaire cutané (CBC) est le cancer cutané le plus fréquent, avec une incidence en augmentation constante.
- Les traitements néoadjuvants actuels, comme les inhibiteurs de la voie Hedgehog, sont limités par des effets indésirables fréquents.
- L'étude NeoBCC a montré que 50 % des patients traités avec T-VEC ont pu être opérés sans reconstruction complexe, avec un taux de réponse globale de 55,6 %.
- Le profil de sécurité de T-VEC a été favorable, avec des effets indésirables principalement locaux et de faible grade.

Article original : RESSLER JM, PLASCHKA M, SILMBROD R *et al.* Efficacy and tolerability of neoadjuvant therapy with Talimogene laherparepvec in cutaneous basal cell carcinoma: a phase II trial (NeoBCC trial). *Nat Cancer*, 2025;6:51- 66.

Retrouvez cette fiche en flashant le QR code ci-dessous

